

Produto	Reg. MAPA
Visafertil TriploPós	SP 002020-6.000003
Categoria	Natureza física
Fertilizante Orgânico Composto Classe A - Fluido	Fluido, solução verdadeira
Modo de aplicação principal	Modos de aplicação alternativos
Via Foliar	Via Fertirrigação; Via Hidropônica; Via Solo

Composição

Composto orgânico, substâncias húmicas, aminoácidos naturais e sacarídeos.

Garantias

N sol. H2O	Ácidos fúlvicos (%)	Condutividade elétrica	P205 sol. H2O	Aminoácidos livres (%)	Índice salino (%)
2% (23,6 g/L)	19,0	1,8 mS/cm	1% (11,8 g/L)	4	19
K20 sol. H2O	pH	Solubilidade 20°C	Carbono orgânico (%)	Maior relação soluto/solvente	Densidade (kg/m³)
4% (47,2 g/L)	6,4	1.000 g/L	12	10 ml/L	1.180,30

Informação do Produtor

Girardi Ambiental LTDA | CNPJ 29.359.065/0001-00 | IE 270.032.845.118 | Reg. SIPEAGRO EP SP 002020-6. Av. Prefeito Nelson Cunha, 800 – Jardim Santo Antônio| Conchal/SP | CEP 13.835-140 | Tel. 19 2660-2527 | 19 99110-7497 | E-mail: visafertil@visafertil.com.br | Site: www.visafertil.com.br | Indústria Brasileira.

Imagem ilustrativa



Cuidados e indicações

Uso exclusivo como fertilizante, impróprio para alimentação humana e animal;

Uso proibido na alimentação de ruminantes, armazenar em local protegido de animais;

Uso permitido em pastagens e capineiras somente com aplicação via solo ou fertirrigação. No caso de pastagens, permitir o pastoreio somente 40 dias após a incorporação do fertilizante ao solo;

Conservar em local seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos;

Conservar fora do alcance de crianças e animais;

Evitar inalação e/ou contato com olhos e mucosas;

Consulte o seu engenheiro agrônomo.

Grupo Visafertil

Rodovia SP-191, km 1,5 Mogi Mirim/SP | CEP 13.800-970 | CP70 | Tel. 19 9-9110-7497 | www.visafertil.com.br

Sugestões de dosagens para preparo da calda de aplicação

Culturas	Via foliar	Via fertirrigação	Via solo	Via hidroponia
CAFÉ	1ml/L - 0,2L/ha (Formação de mudas)	2ml/L - 0,4L/ha (Formação de mudas)	-	-
	5ml/L - 1L/ha (Estádios de pré e pós florada)		10ml/L - 2L/ha Aplic.: Estádios de pré e pós-florada	-
CANA-DE-AÇÚCAR	1ml/L - 0,2L/ha (Formação de mudas)	-	10ml/L - 2L/ha (Plantio)	-
MILHO	1ml/L - 0,2L/ha (Formação de mudas)	-	10ml/L - 2L/ha (Plantio)	-
SOJA	10ml/L - 2L/ha (Aplicação: estádios V5 e R5)	-	-	-
FRUTEIRAS PERENES (Citrus, lichia, banana, mamão, abacaxi, manga, caqui, maracujá, goiaba, figo, abacate, uva, pêssogo e maçã)	10ml/L - 2L/ha (Aplicações: estádios de brotação, pré-floração e maturação)			-
HORTALIÇAS E FOLHOSAS (Alface, chicória, rúcula, couve, repolho, couve-flor, brócolis, pepino, melão, tomate, jiló, berinjela, pimentão, salsinha, coentro, aipo, cebolinha e alho-poró)	5ml/L - 1L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)	10ml/L - 2L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)		
RAÍZES, TUBÉRCULOS E BULBOS (Mandioca, batata, cenoura, cebola, alho, rabanete, nabo e beterraba)	5ml/L - 1L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)	10ml/L - 2L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)		-
ORNAMENTAIS (Rosa, crisântemo, gerbera, calêndula, dália, cravo, lírio e lavanda)	5ml/L - 1L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)	10ml/L - 2L/ha (Manutenção: a cada 15 a 20 dias após estabelecimento)		-
ORQUÍDEAS, BROMÉLIAS E ANTÚRIOS	1ml/L - 0,2L/ha (Manutenção: a cada 20 dias)	2ml/L - 0,4L/ha (Manutenção: a cada 20 dias)	-	-

* A tabela acima está baseada em solos de média fertilidade, sendo adequada a análise de solo para obter a dosagem ideal.