

Visafértil Forte

Garantias			
CRA	60% (% m./m.)	CTC	200,0 mmol _c /kg

Indicação de dosagem de aplicação*

Cultura Adubação	Adubação (ton/ha)	Por planta	Época de aplicação
Batata	2 ~ 3		100% no plantio
Tomate (indeterminado)	2 ~ 3	100g + 100g	50% no transplante 50% 1ª cobertura
Tomate (determinado)	2 ~ 3	100 ~ 150g	100% no plantio
Pimentão	2 ~ 3	80g + 80g	50% no sulco de plantio 10 dias antes do transplante 50% 1ª cobertura
Alho/cebola	2 ~ 3		100% no transplante
Couve/repolho	1 ~ 2		50% no transplante 50% 1ª cobertura
Alface		25 ~ 35g	100% no transplante
Cenoura	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Pepino/quiabo	1 ~ 2	1 ~ 2 kg	50% na semeadura 50% 1ª cobertura
Melancia	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Beterraba	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Morango	2 ~ 3	30g	100% preparo do solo antes do transplante
Uva (plantio)	2 ~ 3	500g	100% preparo do solo antes do transplante
Uva (produção)	2 ~ 3	1,3 ~ 1,9kg	50% 7 dias antes da poda 50% 21 dias após a poda
Girassol	1 ~ 2		100% na semeadura
Algodão	2 ~ 3		50% na semeadura 50% em cobertura aos 35 DAE
Café (plantio)	2 ~ 4	1kg	Parcelar aplicação em 2 etapas: no início da fase vegetativa e no início de enchimento do grão
Café (produção)	2 ~ 4	3 ~ 4kg	Parcelar aplicação em 2 etapas: no início da fase vegetativa e no início de enchimento do grão
Laranja (plantio)	2 ~ 4	1kg	100% no plantio
Laranja (produção)	2 ~ 4	5 ~ 6 kg	Parcelar em 2 aplicações: 50% em setembro - outubro 50% em dezembro-janeiro

Cultura Adubação	Adubação (ton/ha)	Por planta	Época de aplicação
Arroz irrigado	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Feijão/soja	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Milho	2 ~ 3		100% preparo do solo antes da semeadura
Cana-de-açúcar (soca)	2 ~ 3		Aplicar no plantio / sulco
Cana-de-açúcar (planta)	2 ~ 3		Aplicar após o corte na linha de plantio
Frutíferas (de clima tropical)	2 ~ 3	2 kg	Parcelar aplicação em 2 etapas: no início da fase vegetativa e enchimento de fruto
Frutíferas (de clima temperado)	2 ~ 3	2 kg	Parcelar aplicação em 2 etapas: no início da fase vegetativa e enchimento de fruto

DAP = Dias após plantio | DAS= Dias após semeadura | DAE = Dias após emergência

**A dosagem ideal deve ser recomendada mediante análise de solo - consulte nossa equipe ou o seu engenheiro agrônomo.*