

Produto		Reg. MAPA		
Visafétil Fruta		MAPA: SP 003871-7.000004 PRODUTO IMPORTADO Fabricante NOVAGRO s.r.l- País: ITÁLIA.		
Categoria		Natureza física		
Fertilizante Orgânico Composto Classe A - Fluido		Fluído, suspensão homogênea		
Modo de aplicação				
Via Solo				
Composição				
Água, carbonato de potássio, ácido fosfórico, extrato de beterraba.				
Garantias				
P205 sol. H2O	10% (123,0 g/L)	pH	6,5	Cond. elétrica
K20 sol. H2O	14% (172,2 g/L)	Maior rel. soluto/solv.	20 ml/L	Ind. Salino:
C-orgânico	10%	Densidade	1.230 kg/m ³	Sol. H2O 20°C 100%
Informação do Produtor				
Visafétil Indústria e Comércio de Fertilizantes Orgânicos Ltda CNPJ 00.976.856/0001-05 IE: 456.054.216.119 Reg. SIPEAGRO EP SP 003871-7. Rodovia SP-191, km 1,5 – Bairro Tanquinho Mogi Mirim/SP Caixa Postal 70 CEP: 13800-970 Tel: 19 2660-2512 19 9-9110-7497 e-mail: visafertil@visafertil.com.br site: www.visafertil.com.br Indústria Brasileira.				
Imagem ilustrativa		Cuidados e indicações		
		Evitar a mistura do produto Visafétil Raiz com produtos cúpricos e óleos minerais;		
		Uso exclusivo como fertilizante, impróprio para alimentação humana e animal;		
		Uso proibido na alimentação de ruminantes, armazenar em local protegido de animais;		
		Uso permitido em pastagens e capineiras somente com aplicação via solo ou fertirrigação. No caso de pastagens, permitir o pastoreio somente 40 dias após a incorporação do fertilizante ao solo;		
		Conservar em local seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos;		
		Conservar fora do alcance de crianças e animais;		
		Evitar inalação e/ou contato com olhos e mucosas;		
		Consulte o seu engenheiro agrônomo.		

Indicação de dosagem de aplicação*

Cultura	Aplicação	Dosagem	
		L/ha	ml/L
CAFÉ	Aplicar no pegamento, no crescimento do fruto e no começo da mudança da cor	2,0 ~ 3,0	10 ~ 15
TOMATE, PIMENTÃO & BERINJELA	Aplicar no pegamento, no crescimento do fruto e no começo da mudança da cor	2,0 ~ 3,5	10 ~ 17,5
PEPINO, ABÓBORA & MELÃO	Aplicar após o pegamento, no crescimento dos frutos e repetir aplicação após 15 dias	2,5 ~ 3,5	12,5 ~ 17,5
MORANGO	Aplicar após o pegamento, no crescimento dos frutos e repetir aplicação após 15 dias	2,0 ~ 3,5	10 ~ 17,5
CITRUS	Aplicar no pegamento, crescimento e enchimento dos frutos, e na mudança de cor	3,0 ~ 4,0	15 ~ 20
MAMÃO	Aplicar no pegamento, crescimento e enchimento dos frutos, e na mudança de cor	3,0 ~ 4,0	15 ~ 20
FRUTEIRAS TROPICAIS (Banana, abacaxi, manga, maracujá, goiaba, abacate, cacau, jabuticaba, lichia)	Aplicar no início do crescimento dos frutos e na mudança de cor	2,5 ~ 3,0	12,5 ~ 15
FRUTEIRAS TEMPERADAS (Uva, pêsego, ameixa, nêspera, kiwi, maçã, pêra, caqui, figo)	Aplicar no início do crescimento dos frutos e na mudança de cor	2,5 ~ 3,0	12,5 ~ 15
HORTALIÇAS & FOLHOSAS (alface, chicória, rúcula, couve, repolho, couve-flor, brócolis, salsinha, coentro, aipo, cebolinha, alho-poró)	De duas a três aplicações durante o ciclo	2,0 ~ 3,0	10 ~ 15
ORNAMENTAIS (rosa, crisântemo, gérbera, calêndula, dália, cravo, lírio, lavanda)	Aplicar após o florescimento e repetir a cada 10 - 15 dias	2,5 ~ 3,0	12,5 ~ 15

*A dosagem ideal deve ser recomendada mediante análise de solo e condições da cultura - consulte nossa equipe ou o seu engenheiro agrônomo.